

F-TOP

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

F-TOP ΓΠ160Ι 20-20-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Για γενική ισορροπημένη λίπανση

F-TOP 25-12-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Στην εκκίνηση των καλλιεργειών για γρήγορη ανάπτυξη.

F-TOP 30-10-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Στην εκκίνηση των καλλιεργειών για γρήγορη ανάπτυξη.

F-TOP 23-3-23+2MgO & 23-6-23+2MgO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Σε φάσεις της καλλιέργειας ή καλλιέργειες που δεν απαιτείται Φώσφορος.

F-TOP 22-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Για γενική ισορροπημένη λίπανση

F-TOP 38-5-5+0,5Zn

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Στην εκκίνηση των καλλιεργειών για γρήγορη ανάπτυξη και για καλλιέργειες ευαίσθητες στην έλλειψη ψευδαργύρου.

F-TOP (ΓΠ 60) 15-30-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Κατά τη μεταφύτευση και ψεκασμοί στην περίοδο άνθησης-καρπώδεσης.

F-TOP 12-48-8

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Κατά τη μεταφύτευση και στην περίοδο άνθησης - καρπώδεσης, για μεγάλες απαιτήσεις Φωσφόρου. Ειδικό για ψεκασμούς στο βαμβάκι στα χτένια, για πλούσια ανθοφορία, καταστολή της βλάστησης και μέγιστο καρπούδι.

F-TOP 12-6-40

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Κατά την καρποφορία για καλλιέργειες με μεγάλες απαιτήσεις σε Κάλιο. Καλή ποιότητα καρπών.

F-TOP 11-7-27+5MgO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Κατά την περίοδο της καρποφορίας.

F-TOP 10-5-35+5MgO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Κατά την περίοδο της καρποφορίας.

F-TOP 0-17-34+6MgO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Κατά την περίοδο της καρποφορίας και σε περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται άζωτο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ F-TOP

Τα **F-TOP** είναι υδατοδιαλυτά διαφυλλικά λιπάσματα υψηλής αμερικάνικης τεχνολογίας.

- Περιέχουν ΑΖΩΤΟ (N) ΦΩΣΦΟΡΟ (P), ΚΑΛΙΟ (K) και είναι εμπλουτισμένα με ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή EDTA (Σίδηρο, Μαγγάνιο, Βόριο, Ψευδάργυρο, Χαλκό, Μολυβδαίνιο και Μαγνήσιο).
- Τα κύρια στοιχεία (ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΚΑΛΙΟ) περιέχονται σε υδατοδιαλυτή μορφή. Είναι υψηλής καθαρότητας απαλλαγμένα από κάθε τοξικό στοιχείο με τη μέθοδο ανακρυστάλλωσης. Ειδικά παρασκευασμένα για την παραγωγή Διαφυλλικών λιπασμάτων και τροφίμων.
- Τα **F-TOP** δεν περιέχουν Χλώριο (CL) και Νάτριο (Na+).
- Τα **F-TOP** έχουν χαμηλή αγωγιμότητα και δεν αυξάνουν την αλατότητα του εδάφους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ :

- Τα **F-TOP** μπορούν να χρησιμοποιηθούν με απόλυτη ασφάλεια για ψεκασμούς στα φύλλα των φυτών (διαφυλλικά) και διαλυμένα στο νερό της άρδευσης μέσα από το σύστημα της σταγόνας ή των μικροεκτοξευτών. Ή ακόμη και για επιφανειακή λίπανση (διασπορά με το χέρι).
- Τα **F-TOP** παρέχουν στα φυτά ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή και στις σωστές αναλογίες έτσι ώστε κατά περίπτωση να επιτυγχάνουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (αντιμετώπιση των Στρές, πλούσιο ριζικό σύστημα, ενίσχυση της ανθοφορίας, ανάπτυξη των φυτών, ενίσχυση της καρποφορίας, βελτίωση της ποιότητας κ.λπ.).
- Ο τύπος και η ποσότητα του λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας και το στάδιο ανάπτυξης.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ :

A. ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ :

Ψεκασμοί 200 - 300 γραμμάρια στα 100 λίτρα νερό.

Συνδυάζονται με όλα τα φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα, εκτός από τα πολύ αλκαλικά π.χ. Βορδιγάλειος πολτός, Θειασβέστιο ή σκευάσματα πυκνά σε χαλκό.

B. ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΕΙΣ :

Δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια, 2 - 6 κιλά / στρέμμα.

Κηπευτικά (υπαίθρια-θερμοκηπίου) 1 - 4 κιλά / στρέμμα

Μεγάλες καλλιέργειες 2 - 6 κιλά / στρέμμα.